

Delsystem: Tvåvägs Stayman (Dubbelstayman)

Ursprung: Metoden har vuxit fram genom kombinationer av olika Staymanvarianter.

Skapat datum: Oklart.

Syfte: Sangöppnarens partner kan omedelbart klargöra huruvida hans hand är utgångskrävande eller ej.

Beskrivning

Svarsbuden 2♣ och 2♦ på 1NT frågar båda efter 4-korts eller längre högfärg. 2♦ är utgångskrävande medan 2♣ är på sin höjd utgångsinviterande.

Exempel:

Väst	Öst	
1NT	2♣	
2♦		ingen 4-korts högfärg
2♥		4-korts hjärter, ev 4-korts spader
2♠		4-korts spader, ej 4-korts hjärter
Väst	Öst	
1NT	2♣	
2♦		
	2♥/♠	5+-färg
	2NT	invit till 3NT utan 5-korts högfärg
	3♣/♦	6+-färg
	3♥/♠	6+-färg
Väst	Öst	
1NT	2NT	Utgångsnvit utan 4-korts eller längre högfärger
Väst	Öst	
1NT	2♣	
2♦	2♥	
pass		minimum, ev dubbelhjärter
2NT		maximum, dubbelhjärter
Väst	Öst	
1NT	2♣	
2♥	2♠	5-korts spader
	2NT	4-korts spader
Väst	Öst	
1NT	2♦	
2♥		4-färg i hjärter, ev även i spader
2♠		4-färg i spader men ej i hjärter
2NT		ingen 4-korts högfärg
3♣/♦		5-färg
Väst	Öst	
1NT	2♦	
2NT	3x	egen 5+-färg
Väst	Öst	

1NT 2♦
2♥ 2♠/3x egen 5+-färg

Variationer:

Staymans 2♦ är utgångskrav med en obalanserad lågfärgshand. Handen saknar 4-korts högfärg och har minst en singleton eller renons.

Roths 2♦ är utgångskrav samt slaminvit. 2♦ frågar efter 4-korts högfärger. En konsekvens är att sh:s 2♣ kan innehålla en hand stark nog för att kräva till utgång.

Murrays 2♦ ber öh bjuda sin längsta högfärg. Med lika längd (4-4 eller 3-3) bjuder öh 2 hjärter. En fördel med denna konvention är att den tillåter sh att bjuda svaga obalanserade händer med 5-5 eller 4-4 i hö. Sh lovar inte någon styrka alls men kan ha en stark hand. Ett återbud med 2NT av sh uppmanar öh att bjuda 4-färger nerifrån. Öppnarens återbud måste vara i högfärg utom den gången han har 2-2. Då bjuder han 2NT eller en 6-korts lågfärg.

Augusts 2♦ är en variant av Murrays 2♦ med tillägget att alla icke hoppande återbud av sh på andra varvet är avläggsbud. Detta tillåter sh att använda konventionen med en svag 4-5 i hö-lå. Om öh bjuder fel högfärg återvänder sh till sin lågfärg.

Truscotts 2♦ är en relämetod utvecklad av Alan Truscott och används flitigt i Israel. Den intresserade hänvisas till andra källor

Version & datum: 1 - 2004-04-18

Beskrivet av: Arne Frennelius